

Par lequel on tend à prouver que la plupart des accouchemens laborieux proviennent de l'attachement lateral du Placenta, de la deviation subsequnte de la matrice et de la situation oblique de l'enfant, avec des recherches sur les causes de l'attache variée du Placenta et des consequences physiques et pratiques fondées sur des observations; envoyé à l'Academie Royale de Chirurgie par M. Pietsch, D. en M. Demonstr. en Anat. Chirurg. &c. &c.
à Runingue du 28 Juin 1772.

Je crois avoir suffisamment démontré dans mon premier memoire que l'attache fortuite du placenta dans un autre endroit de l'interieur de l'uterus que dans son fond est la cause la plus commune de la deviation de ce viscere, de la situation oblique de l'enfant et des accouchemens plus ou moins laborieux selon la variété de cette attache. La consequence de cette insertion du placenta est si constante qu'elle a même lieu lorsqu'il y a plus d'un enfant dans la matrice et qu'il y a par consequent plusieurs placenta; car alors l'enfant dont le placenta s'est greffé positivement ou du moins approchant au fond de l'uterus se presentera bien et le premier et la femme en accouchera facilement, tandis que l'autre dont le placenta est éloigné de ce même fond, sera mal situé et que la mere en accouchera rarement que par le secours de l'art. Plusieurs observations que j'ai faites depuis quelques années viennent à l'appui de ce que j'avance. En voici une

Obs. IX. Le 30 Maj 1763. Je fus appelé à onze heures du matin chez le nommé Spar, boucher en la ville d'Alt-Kirch pour secourir sa femme en mal d'enfant, je la trouvai accouchée d'une fille vivante. Elle se tenoit dans



ARC 28 L. 12 n° 80

le moment de mon arrivée a travers du lit appuyée sur les genoux et les coudes. Le ^{Dr} Düringer, Chirurgien juré de la dite ville qu'on avoit fait venir avant moi, me dit, qu'il avoit touché la femme et qu'il n'avoit trouvé ni pied, ni tête de l'enfant. Je fis coucher la femme sur le dos, en la touchant je trouvais l'enfant situé dans la région iliaque droite, la tête entre ses jambes, faisant pour ainsi dire une pelotte dans un sac formé par la matrice et présentant par l'ouverture le bras gauche pendant sur l'os pubis de ce côté.

Je passai ma main droite très courbée au poignet par dessus le pubis, et en la fourrant dans ce sac je la soulevai par en dehors avec ma main gauche; je fis ensuite de saisir un pied que j'amenai dans le vagin où je l'attachai à une jarretière. Pendant cette manœuvre le placenta de l'enfant ne se détacha du fond de l'utérus et causa une perte de sang considérable, je me hâtai pour trouver l'autre pied, les ayant joints je tirai l'enfant mort et mâle et je délivrai promptement la mère du placenta qui tenoit dans ce sac. L'endroit de la matrice où s'étoit greffé ce placenta le suivit dans l'extraction jusques hors du vagin, mais il se retira à mesure que la totalité de la matrice se contracta. Pour marquer la durée de cette opération, il est bon de dire, que j'entrai dans la maison à onze heure sonnant et que midi n'étoit pas encore sonné quand j'en sortis.

Je prie le lecteur de faire attention au phénomène de la sortie d'une portion de la matrice à laquelle le second placenta étoit attaché, parceque j'aurai occasion de parler d'un fait semblable dans l'observation suivante. Etur cette dans l'examen que je fis de ces deux placenta je les trouvais joints et deprimés aux bords qui se touchoient et ils n'offroient à la vue rien que de fort naturel, excepté que l'écouard de l'un n'étoit pas implanté à la même distance des bords deprimés que l'autre l'étoit.

Obs. X. Le 1 Juillet 1768 je fus appelle' à quatre heures après midi chez la femme du nomme' Poncet, sergent de garde en la ville d'Altkirch. Y étant arrivé la nommée Nanse - sage femme me dit, qu'elle étoit en mal d'enfant depuis sept heures du matin; qu'à trois heures elle accoucha d'un garçon; que le ventre étant resté gros on avoit envoyé chercher le Sr. Vauclair, Médecin - Physicien de la ville, parce qu'elle présuinoit qu'il y eût un second enfant; que le dit Sr. Vauclair après avoir visité la femme ordonna qu'on la laissât tranquille et que s'il y eût un second enfant il le mangeroit, si peu qu'il se doutoit qu'il y en eût un second. Surquoi la Sage femme fit convoquer les parrain et marraine arrêtés, habilla l'enfant né et le porta à l'église pour lui faire donner le Sacrement du baptême; de retour à la maison voyant que le ventre de la femme n'avoit pas baissé, elle y porta la main et trouva un second enfant qui se presentoit mal, elle insista à ce qu'on me fît venir.

Je trouvai la main gauche dans le vagin, l'occiput appuyé à la concavité de l'os des Isles du côté gauche, les reins couchés sur les pubis, en un mot l'enfant étoit dans une de ces mauvaises situations obliques dont parle Deventer dans son supplément sur son livre des accouchemens. Je soulevai de ma main droite la tête, en la poussant un peu en arriere ainsi que l'épaule gauche, ce qui fit rentrer le bras. Ensuite je portai la gauche dans la matrice et en la repliant en arriere, je passai mes doigts entre les pubis et les reins de l'enfant, j'avansai ainsi petit à petit vers les hanches, je parvins jusqu'aux fesses dont je soulevai la gauche avec mon pource, ce qui fit changer entièrement la mauvaise situation de l'enfant, et me permit de glisser mes doigts le long des cuisses et des jambes jusqu'aux pieds, que je saisis tous deux à la fois et en tournant les talons par en haut



je les amenai dans la vulve, ayant tiré jusqu'aux hanches, je portai mes mains sur les os des Isles et je tirai de nouveau, la tête ne voulant pas suivre, je portai deux doigts de ma main gauche dans la bouche et tournant la face vers l'os sacrum je la degageai sans beaucoup de peine. Le delivre n'ayant pas voulu suivre après tous les efforts que fit la femme, je portai ma main droite dans la matrice et je trouvai le placenta greffé depuis l'orifice de l'uterus sous les regions iliaque et lombaire droites. Je cherchai l'endroit où il fut le plus aisé à decoller, en soulevant le cordon de ma main gauche, je le trouvai posterieurement, je passai ma main dessous et le degageai entierement. En le tirant dehors, la portion de l'uterus, à laquelle ce dernier placenta avoit attache, sortit de la vulve de la longueur de quatre à cinq poudes, de maniere que je pris ce lambeau de chair au premier aspect pour une excroissance surnaturelle ou un polipe uterin, mais pendant que je fis mes reflexions sur cet objet et sur ce qu'il y eut à faire à son egard, je vis ce corps se retirer et le suivant d'une main, je sentis qu'il suivoit les contractions communes de la matrice et qu'il disparut sous ma main. Chaque enfant avoit son placenta particulier, j'y remarquai cette difference qu'au premier le cordon étoit implante à un tier ou environs de son centre, et qu'il se separa spontanement, et que le second avoit son cordon presque au bord qui touchoit à l'orifice de la matrice et qu'il étoit d'une figure ovalaire.

Nous voyons par ces deux observations que dans les cas où il y a plus d'un enfant renfermé dans la matrice, celui qui a son placenta attaché au fond ou du moins vers le fond de la matrice, fait la culbute et au tems préfix se presente droit au passage et naît spontanement et naturellement, tandis que l'autre dont le placenta s'est greffé à l'un des côtés ou proche l'orifice de l'uterus, fait rarement

la culbute au terme ordinaire et qu'il naît gueres sans le secours
de l'art. J'en ai encore une preuve devers moi dans l'obf. suiv.

Obj. XI. Le 12 etout 1788. je fus appelle' à trois heures du matin par le Sr Pierre Raillard, commis aux domaines en la ville d'Altirich pour secourir sa femme en mal d'enfant depuis environs minuit. Je trouvai cette dame accouchée fort heureusement d'une fille vivante. La Sage-femme ayant senti un second enfant avoir crevé les enveloppes, mais voyant qu'il ne se presentoit pas au passage et qu'il étoit mal situé, elle ne voulut pas se charger de ce second accouchement. Je sondeai la position de l'enfant, il avoit la tête couchée sur l'Iléon gauche, et il presentoit le bras gauche au passage. Je reculai un peu la tête et successivement le bras avec ma main droite, ensuite je passai ma main gauche depuis ce bras jusqu'à la cuisse gauche et puis jusqu'au pied en contournant à mesure le corps et le talon en haut, je le passai par un noeud coulant que j'avois fait dans une jarretiere et je voulus chercher et tirer l'autre pied, mais lorsque j'y touchois l'enfant le retiroit, la matrice étant en contraction et serrant l'enfant contre le détroit du bassin, j'aurois risqué de casser ou de disloquer la jambe si j'avois voulu m'obstiner à tirer le pied. Reflexion faite. Je laissai l'extrémité droite couchée le long du corps et saisissant l'enfant aux hanches je le tirai ainsi. Je fis la ligature au cordon et le coupai. Le delivré ne suivant point malgré le tiraillement aux cordons et les efforts de la dame, je portai ma main dans la matrice et le degageai entierement. Un placenta tenoit au fond et l'autre au côté droit de la matrice. L'implantation des cordons en faisoit une preuve. Les deux filles furent baptisées le lendemain à l'église paroissiale. La mere les allaita et donna cinq jours après la cadette à une nourrice dans le village voisin de Karspach.

C'est dans cette dame que j'ai touché et senti bien distinctement les tubercules auxquels se trouvent les

bouches béantes des orifices des vaisseaux qui apportent la nourriture de la mère à l'enfant par l'intus-susception des vaisseaux du placenta, et que les anciens appelloient: Cotylédones.

Il est évident que cet enfant n'avoit pas fait la culbute, ^(a) le défaut de culbute et la mauvaise situation d'un enfant en cas des jumeaux a non seulement lieu lorsque la femme accouche à terme, mais aussi lorsqu'elle fait une fausse couche, l'observation suivante en fait preuve.

Obs. XII. Le 25 Nov. 1763. Je fus appelé à trois heures après midi au village de Hirsingen à une lieue d'Altkirch, pour secourir la femme du nommé Gelsch bourgeois du dit lieu. J'y arrivai après quatre heures et trouvai auprès d'elle le ^r Oberlin, chirurgien du lieu, il me dit, qu'elle avoit senti les premières douleurs à huit heures du soir la veille, qu'à neuf heures les eaux avoient percé et que le premier enfant étoit venu naturellement, que le second n'ayant pas voulu suivre de même, il avoit touché la femme et avoit trouvé un bras dans le passage, qu'il avoit fait son possible pour terminer cet accouchement par art sans y réussir, il me montra en même temps un bras avec son omoplate qu'il avoit arraché, l'étoit le droit. Je jugeai par ce bras et par l'enfant qui étoit déjà au monde, que ces deux enfans pouvoient être de six mois.

Après avoir disposé la femme à se laisser toucher, je ne trouvais point d'orifice, du moins il étoit si exactement fermé (sermé) que je ne pus le distinguer en touchant à différents endroits au corps de la matrice. Je m'aperçus enfin d'un bout de cordon ombilical, blanc et gros comme une grosse paille pendant dans la vulve; je saisis ce bout avec le ponce et l'index de ma main gauche et en le tirant un peu je le suivis de l'index de l'autre main et je parvins ^(a) provenant de l'attache laterale du placenta.

à introduire ce doigt dans l'orifice qui étoit tourné du côté^{7.}
de l'os sacrum, tirant un peu du côté gauche, petit à petit
j'y introduisis le médius, sentant que la tête étoit couchée
dans la cavité de l'Oleon du côté gauche et le dos tourné
vers les pubis, je changeai de main, ayant glissé deux
doigts de la gauche depuis l'épaule arrachée jusqu'à la fesse
je parvins à saisir le pied droit et à le tirer par l'orifice,
j'allai tout de suite chercher le gauche, en les tenant tous
deux je tirai l'enfant jusqu'aux hanches, entirant
d'avantage je sentis que le tronc alloit se séparer, pour
éviter cet accident, je fis du doigt index un crochet que je
passai par dessus l'épaule gauche, l'autre manquant, après
avoir dégagé le bras et tirant par le corps, les vertèbres du
col se séparoient et je voyois le moment que la tête alloit
rester dans la matrice, pour l'empêcher je passai le dit doigt
par dessus le vertex, enfonçant la fontaine j'évidai du
cerveau autant que j'en pouvois tirer avec ce doigt, puis
je le passai dans la bouche tirant par la mâchoire, mais
celle-ci ayant manqué, je portai de nouveau ce doigt dans
le crâne et je tirai ainsi la tête. Le placenta, du premier enfant
greffé, au fond de la matrice se détacha spontanément, je
décernai l'autre, qui tenoit tout proche de l'orifice postérieu-
rement. Il est à remarquer que je ne pus jamais parvenir
à faire entrer dans la matrice plus de deux doigts, l'index
et le médius, avec lesquels je fus obligé de parfaire l'opération.
Cette femme avoit trois enfans vivans, dont elle étoit accou-
chée fort heureusement, elle avoit l'âge d'environ vingt huit
ans et jouissoit d'ailleurs d'une bonne santé.

On voit dans cette observation que l'enfant avoit aussi le
devant du corps tourné vers l'attache du placenta latéral, d'où
on peut inferer que c'est cette attache qui détermine la
mauvaise situation de l'enfant qui tient à ce placenta.



Elle prouve en outre que cette attache laterale ne depend point de quelque conformation ou disposition originaires ou particulieres de l'uterus, mais qu'elle est fortuite, ou pour mieux parler physique, dependante de quelque cause jusqu'à present inconnue, puisque toutes les femmes qui font les sujets de ces observations avoit eu auparavant plusieurs enfans, la dame Raillard en avoit eu même jusqu'à onze dont elles estoient accouchées fort heureusement.

On me demandera peut etre comment les placenta des enfans jumeaux doivent etre greffés dans l'uterus, pour que cet organe ne souffre aucune deviation et qu'il n'en naisse une mauvaise situation pour l'un de deux enfans, puisqu'il ne peut jamais y avoir qu'un seul placenta qui ait pris racine positivement au fond de l'uterus.

Je reponds, fonde sur le mecanisme des parties, que le centre de la jonction de deux placenta doit repondre au centre du fond de l'uterus, n'importe que la ligne de cette jonction soit vertical ou transversal, dans l'une ou l'autre de cette direction l'interieur de cet organe est partagé en portions egales, il ne souffre aucune deviation, il n'en resulte aucune mauvaise situation pour les enfans, ils sont à l'aise pour faire chacun dans son tems la culbute, celui qui la fait le premier presente la vertex à l'entrée superieure du bassin et bouche le passage à l'autre, qui en attendant tient sa tête appuyée dans la creux des os des Isles du côté où il se trouve.

Si la ligne de la jonction des placenta est transversale il en doit resulte que les jumeaux auront la face tournée l'un anterieurement et l'autre posterieurement placés neanmoins chacun dans un des côtés, en sorte qu'en faisant la culbute, l'un doit presenter la face en devant ou en dessus, et l'autre en arriere ou en dessous; car je pose pour principe que suivant les loix de la gravité spécifique du corps,

9.
deux corps d'un égal poids, l'un doit entraîner l'autre du côté où il a de la pente. Or, la tête de l'enfant, étant à peu près du même poids que le reste du corps et ayant dans sa position naturelle de la pente en devant, il doit aussi faire la culbute de ce côté là. Lorsqu'il y a trois enfans renfermés dans la matrice, le centre de la jonction des trois placenta doit répondre au centre du fond de la matrice, pour que ce viscere soit maintenu dans son equilibrium et les enfans dans leur situation naturelle. Il seroit inutile de vouloir approfondir comment les placenta doivent être placés lorsqu'il y a plus de trois enfans contenus dans l'uterus, parce que la nature ne passe gueres ce nombre dans la procreation des enfans en une fois dans la femme; d'ailleurs si cela arrivoit comme nous en avons des exemples, il faudroit que l'attache des placenta fut de même que dans le cas des trois, et quand même ce ne seroit pas; leur sortie ne souffriroit gueres de difficulté vu le petit volume de chaque enfant et le vuide spacieux du passage.

Mais si il arrive qu'un enfant ne fait pas la culbute il faut supposer, (presumer) que la tête à proportion du corps n'a pas assez de poids pour l'entraîner, ou que le placenta s'étant greffé postérieurement et ainsi adossé à la colonne vertebrale celle-ci s'oppose au mouvement de la culbute et l'enfant allongeant ses jambes jusques dans le petit bassin, il est ainsi maintenu dans sa position jusqu'au terme prefix de l'accouchement dans lequel il se présentera par les pieds.

J'ai dit plus haut que l'attache laterale du placenta ne provenoit point de quelque conformation particuliere de l'uterus, car si cela étoit, il faudroit que celle attache fut constante dans toutes les grossesses d'une femme, ce qui n'arrive cependant pas. Mais si la matrice a originaiement, prend



ou contracte par la suite cette disposition à recevoir l'insertion du placenta dans un autre endroit de son pourtour intérieur que dans le fond, ou les points limitrophes du centre de ce dernier, cet organe est sujet à récidiver dans cette mauvaise disposition, comme on le verra par l'observation suivante, c'est pourquoi l'attache laterale du placenta dans une premiere grossesse, doit toujours être censée comme un mauvais présage pour les grossesses suivantes. En voici un exemple.

Obs. XIII. Le 30 Oct. 1764. Je fus appelé vers dix heures du soir chez la nommée Magdelaine, femme de Jacob, cocher du Sr. Streicher, Receveur principal des droits reuxis résident à Ettkirch pour secourir la femme en mal d'enfant depuis quatre heures l'après midi. J'y trouvais le Sr. Düringer, Chirurg. juré de la dite ville, qui me dit, qu'il avoit touché la femme, et qu'il n'avoit pu trouver ni la tête, ni les pieds de l'enfant, mais qu'il avoit senti une grosse masse de chair qui le trouvoit et le tenoit, pour ainsi dire, caché. Je trouvais le bras gauche hors de la vulve, la peau de la main tournée en dessus et le cordon ombilical pendant et excédant la main. Je suivis le bras et je sentis que l'enfant étoit couché dans la region iliaque droite la tête entre les jambes, le placenta greffé au même endroit en partie détaché et couvrant l'enfant. Je repoussai le bras, et je cherchai à trouver les pieds, lesquels étant confondus et quasi entremelés avec le placenta et l'autre bras, j'eus beaucoup de peine d'en amener un dans le vagin, où l'ayant arrêté avec une jarretiere, j'allai saisir l'enfant mort et le tirai. L'arrière-faix le suivit spontanément. La mere se retablit en peu de jours.

L'année suivante la femme étant redevenue enceinte et ayant porté son fruit à terme se trouva dans le même mois et à peu près le même jour dans le même cas où elle se trouva l'année précédente, c'est à dire, les membranes se rompirent vers les cinq heures du soir, les eaux s'écoulèrent et l'enfant presentoit un bras. Au lieu de venir me chercher la nommée Xänsé, Sage-femme demanda le Sr. Pels, chirurgien point instruit dans l'art des accouchemens, celui-ci

ayant alternativement avec la sage femme farfouillé dans le corps de la femme depuis neuf jusqu'à onze heures sans la délivrer, se retira. Et deux heures après minuit le mari retourna implorer le secours de ce chirurgien, qui lui déclara qu'on ne pouvoit tirer l'enfant sans qu'on le coupât et le tirât par morceaux, opération dont il ne vouloit pas se charger, crainte que la femme n'en meure et qu'on ne lui en attribue la faute.

On baissa la femme dans cette triste situation jusqu'à dix heures du matin, que le mari vint en pleurant me prier de secourir sa femme, et me conta tout ce que je viens de rapporter. Je balançai si je devois deférer en sa demande: reflexion faite; la charité chrétienne l'emporta sur tous les autres motifs qui devoient m'engager à ne pas me mêler d'un cas aussi périlleux et dont on ne pouvoit gueres esperer une issue heureuse.

Arrivé dans son logis je trouvai la femme les joues enfoncées, le nez pointu, les yeux hagards, le pouls petit et tremblottant, le corps couvert d'une sueur froide, le bras gauche de l'enfant mort, le dos de la main tourné en dessus, et deux bouts du cordon ombilical pendans hors de la vulve. Je fis rentrer le bras en poussant par l'aisselle et ayant saisi les pieds je tirai l'enfant et puis je délivrai la femme de son arriere faix, le placenta tenoit du côté gauche. Je fis cette opération, qui ne dura gueres au delà d'un quart d'heure en presence du d^t Pels, que j'avois fait venir.

Ma main ayant introduit après ma main dans la matrice pour en faire sortir les coillots de sang ou autres corps étrangers, s'il y en eût, je trouvai la matrice fendue verticalement depuis son fond jusqu'à son col; je ne voulus m'en croire au premier toucher, je tournai ma main de côté et d'autre et revins au même endroit où je trouvais constamment la matrice fendue, un bord de la plaie couvert de circonvolutions de l'intestin ileon, que je passai entre mes doigts, l'autre bord étoit gonflé et me paroissoit au toucher que si je mettois mes doigts sur une côte de melon. Je repoussai ce paquet d'intestin et je fis coucher la femme au côté opposé le corps presque horizontalement (a) à gauche de la colonne vertebrale.



au renta j'employai tout ce qui pouvoit contribuer à sa conservation pas moins elle mourut au bout de dix huit heures.

Cette observation prouve encore que l'attache laterale du placenta n'est pas constamment la même dans le même sujet; l'année précédente cette insertion du placenta se trouvoit du côté droit, tandis que dans l'année après elle étoit du côté gauche, cette variété de l'attache du placenta me fait faire les questions suivantes.

1) Quelle peut être la cause déterminante de l'attache du placenta dans un autre endroit du pourtour intérieur de la matrice que dans son fond?

2) Y auroit-il une disposition particulière dans l'utérus des certaines femmes pour cette susception du placenta?

3) Cette disposition dépend-elle de la première conformation de cet organe ou peut-elle s'engendrer et se former par la suite? ou cette implantation est-elle un pur effet du hasard?

4) Y auroit-il des moyens de prévenir et d'empêcher l'attache laterale du placenta et de déterminer son implantation au fond de la matrice, comme dans son lieu naturel?

C'est ce que je me propose de rechercher, non pas dans l'esperance d'approfondir les sujets de ces questions, mais du moins à faire naître aux gens de l'art des idées pour pousser leurs recherches plus loin.

Je pose d'abord pour principe que le hasard ne peut avoir lieu dans l'ordre physique, mais que tout ce qui arrive dans la nature dépend de l'essence, de la forme et de la disposition de la matiere, mais la raison pourquoi telle essence, telle forme, telle disposition existe dans la matiere d'un tel sujet et non pas dans celle d'un autre d'une même espere etc pourquoi ses effets se manifestent dans un tems et non pas dans un autre, c'est ce que je laisse à discuter aux metaphysicien. Je passe à la première question.

J'ai déjà dit plus haut que le fond de l'utérus paroît être destiné et formé pour cette implantation du placenta en ce que 1/ il est plus épais que le reste de la matrice et par conséquent capable d'une plus grande extension sans diminuer beaucoup de son épaisseur à proportion du reste. 2/ suivant les découvertes de Ruysch il est pourvu d'un muscle dont les fibres circulaires sont aussi propres à se dilater et se prêter à l'épanouissement du placenta, qu'à se contracter et occasionner son expulsion 3/ sa structure étant plus épaisse elle est aussi entrelassée d'un plus grand nombre des vaisseaux qui y apportent des sucs propres et suffisans à la nourriture du fœtus 4/ par conséquent il se trouve à sa face interne plus des orifices béantes (cotyledones) pour l'intus-susception des houpes mamelonnées du placenta 5/ il paroît donc naturel que l'impulsion de l'œuf fécondé doit se porter vers l'endroit de la matrice qui est le plus disposé et le plus susceptible à le recevoir, d'autant plus que ^{est} dans cet endroit à peu près que le dit œuf entre dans la matrice et qu'il y trouve le plus grand vuide. Comme cette conformation et cette disposition de la matrice sont les plus conformes aux loix de la nature, il arrive aussi que le plus grand nombre des femmes est accouché et délivré heureusement.

Mais cette conformation peut manquer par un défaut d'arrangement des molécules dans la matière principe du sujet individuel, et elle peut se trouver dans un autre endroit de la matrice, de manière que ce point ^{acquiert} ces mêmes dispositions et les mêmes facultés que devoit avoir le fond de la matrice et que l'œuf fécondé tourne par une disposition mécanique le point qui doit former le placenta vers le point de la matrice qui est le plus susceptible et le plus disposé à le recevoir. Ce point est celui où étoit son péduncule pour l'attache dans l'ovaire, qui

est un peu rouge par l'entrelassement des vaisseaux sanguins, c'est par cet endroit qu'il est capable de s'attacher et se greffer à l'ovaire, dans la trompe de Fallope, ou s'il échappe du pavillon de celle-ci à quelque autre partie du bas ventre et de former ainsi une grossesse ventrale. Mais comme ces cas arrivent si rarement, on doit les regarder comme hors de l'ordre de la nature, je me borne à son implantation dans le pourtour intérieur de la matrice. Cette-ci ne se faisant pas toujours à son fond, il est à présumer que tout le pourtour intérieur est susceptible à le recevoir et préférentiellement son fond. Cette préférence vient de sa structure, laquelle dans certaines femmes peut avoir changé de place dès la première conformation, puisqu'on en voit qui par la même cause de l'attache latérale du placenta ont sept huit accouchemens laborieux et y périssent à la fin.

Ainsi il faut admettre que dans ces femmes cette structure et cette disposition pour la surception du placenta se trouvent dès leur première conformation dans un ou plusieurs points latéraux de la matrice.

Mais comme il y a des femmes dont le placenta est attaché positivement au fond de l'uterus, quo pour cette raison les enfans se présentent bien et qu'elles ont un, deux et même plusieurs accouchemens aussi heureux que faciles, et que dans la suite il arrive qu'elles ont un accouchement fort laborieux (a) par l'attache latérale du placenta, il est à présumer que la structure ou du moins la disposition du fond de l'uterus a recevoir le placenta a changé et qu'un autre endroit de la matrice a acquis la même faculté, produite successivement par l'ouverture et la disposition des vaisseaux sanguins dans l'écoulement du flux périodique et que cette disposition peut changer et redevenir au fond de cet organe. Il est donc vraisemblable que cette

(a) la dame Raillard obs. XL.

12.
disposition peut s'engendrer et se former dans la femme sans remonter même jusqu'à sa première conformation.

Tout ce que je viens de dire tend à découvrir la cause de l'attache latérale du placenta, mais il est question pour la pratique et le bien de l'humanité de savoir s'il y a des moyens de prévenir cette attache et de déterminer son implantation au fond de l'utérus.

Le plus grand nombre des physiciens a été jusqu'à présent d'accord que dans l'acte du coït l'oeuf le plus mur étoit empoigné par le bout frangé de la trompe de fallope et porté à l'instant même dans la cavité de la matrice pour y être fécondé par la semence virile. Mais suivant le nouveau système de M. Raulin dans son traité de la conservation des enfans Tom. 1. pag. 61. l'oeuf est déjà fécondé tenant encore à l'ovaire et son transport de là dans la matrice ne doit s'opérer que dans l'espace de plusieurs jours, système qui souffre encore beaucoup de difficulté; mais n'importe, que l'oeuf soit fécondé ou dans l'ovaire ou dans la matrice, qu'il soit transporté dans l'instant ou en plusieurs jours de son origine au lieu de sa destination, cela est indifférent à notre question, ce qui nous intéresse, c'est, de savoir le mécanisme de son attache dans le pourtour intérieur de la matrice, et de trouver des moyens pour déterminer son implantation (insertion) au fond de cet organe.

L'oeuf étant entré dans l'utérus, il y reste flottant pendant un tems dont nous ignorons la durée, mais il est certain que l'endroit par lequel il étoit attaché (collé) à l'ovaire conserve ses petites racines, lesquelles s'insinuent dans les trous dont la membrane interne de ce viscère est percée, et c'est en ce même endroit, marqué par un entrelassement des vaisseaux sanguins très déliés que se forme le placenta, ainsi il s'agit que ce point qui selon les loix de la gravité des corps doit être le plus pesant, soit
spécifique

tourne' et maintenu vers le fond de la matrice; et voici l'idée que j'ai de cette insinuation ou insertion du placenta.

Ces petites racines qui se trouvent à l'endroit susdit trouvant les pores du fond de l'uterus le plus ouverts et disposés à les recevoir, s'y insinuent par une pente naturelle et après avoir établi une communication avec les vaisseaux de la matrice, elles restent inherentes en cet endroit. Mais comme cette même dispositions dans les pores de la matrice peut exister dans une des parties laterales ou même sur l'orifice interne de la matrice, le placenta y peut jeter ses racines et s'y greffer avec la même facilité.

Néanmoins comme il arrive le plus souvent que le placenta s'attache au fond de la matrice ou à un de ses points limitrophes, je trouve la cause dans le mechenisme des deux parties conjointes après l'acte de la conception. La voici. Il est démontré que l'orifice de la matrice après la conception se reserre à un point 1) qu'il change sa figure de bouche de petit chien et qu'il devient tout à fait pointu et ridé 2) qu'il devient le maître du reste de la matrice qui est obligé de céder à l'impulsion de l'oeuf grossissant. Mais cette impulsion n'a pas lieu avant que l'oeuf fécondé et entré dans la matrice n'ait acquit assez de volume pour remplir la vacuité naturelle de la matrice hors l'état de grossesse, laquelle est censée pouvoir contenir une amande, dont selon la forme de la matrice il faut supposer la pointe en bas, l'oeuf se trouvant aux premiers jours de la grossesse dans cet espace triangulaire reste flottant; le point où doit se former le placenta est censé le point le plus fort, le point opposé le plus foible est par conséquent plus susceptible de compression et cedant facilement au resserrement ^{du col} de la matrice, le point où doit

12.

se former le placenta est tourné vers le fond de la matrice, etant maintenu dans cette position il y prend adhérence et s'étant ainsi fait un point d'appui il étend en grossissant la matrice en tout sens.

Mais comme l'attache du placenta ne se fait pas toujours au fond de l'uterus ou à un de ses points limitrophes, il faut croire, ou 1, que des causes procathartiques et inconnues changent ce mécanisme naturel, ou 2, que la structure et la disposition du fond de l'uterus pour recevoir le placenta ne s'y rencontrent pas naturellement ou qu'elles ne sont pas assez développées et qu'un autre endroit du pourtour intérieur de la matrice a été dans ou qu'il a acquis cette disposition, ou 3, que l'œuf par son attouchement y fait naître cette disposition, en ce que ses radicules étant constamment tournées vers un autre côté dans la matrice, y entrent dans les pores et communiquent avec les vaisseaux de ce viscere.

Mais ce n'est pas assez que de savoir par quel mécanisme se fait l'adhérence du placenta dans toute l'étendue du pourtour intérieur de l'uterus, supposons qu'il fut tel que je viens de l'expliquer et l'exposer, il s'agit pour le bien de l'humanité et le progrès de connoissances humaines de savoir s'il y a des moyens d'empêcher cette insertion aux parties laterales et de déterminer son implantation au fond de ce viscere?

Pour répondre à cette question j'avouerai d'abord que notre science n'est fondée à cet égard que sur des conjectures et que pour trouver quelque lueur de vraisemblance nous y allons entatonnant dans les ténèbres. Car 1, je ne connois aucun signe caractéristique par lequel on puisse reconnoître cette disposition de la matrice,

puisque nous ne nous en appercevons jamais, qu'après coup, c'est à dire, par le fait même, et 2) quand même nous pourrions découvrir d'avance cette disposition dans l'utérus, je ne crois aucun remède tant interne que topique assez efficace et puissant pour changer cette disposition, excepté les bains minéraux soit naturels, soit artificiels, et encore ne pourrais-je expliquer de quelle façon ils opéreroient ce changement, hormis que je ne veuille dire qu'en corrigeant l'intempérie de ce viscère, ils le remettent dans l'intégrité de ses fonctions.

Nous ne trouvons donc d'autre ressource que dans la position ou l'attitude de la femme après la conception. L'opinion vulgaire, surtout des femmes lorsqu'elles ont des accouchemens laborieux, c'est d'avoir porté un enfant précédent ou étranger souvent sur un côté de leur ventre, et d'avoir poussé par là l'enfant naissant au côté opposé, et je crois qu'elles n'ont pas tout à fait tort; car il est certain que lorsque le ventre est pressé d'un côté, que cette pression change la position de la matrice et l'équilibre pour la tournure de l'œuf. Le corps de la femme étant plié continuellement ou du moins souvent vers un même côté, il est sur que les membranes et les ligamens qui tiennent ce viscère assujetti doivent se raccourcir de ce côté là et s'allonger au côté opposé, et il doit nécessairement acquérir et conserver même une pente vers ce côté. Or, la femme ayant conçu, l'œuf suit cette pente, et par la suite le point de l'œuf où doit se former le placenta étant, ou du moins devenant le plus pesant, il prend son équilibre et se tourne du côté où il trouve le plus de vuide, et quand cet endroit que ce

point touche ne seroit point disposé à favoriser l'adhérence du placenta et que cette disposition se trouvat dans un autre endroit de la matrice, ce dit point par son attouchement y fera naître cette disposition et ses radicules s'allongeant à mesure entreront dans les pores qui se trouvent au dit endroit de ce viscere. Le placenta ayant une fois pris racine, il suit l'expansion de la matrice, ce viscere prend et conserve son obliquité, fait naître la situation oblique de l'enfant et cause l'accouchement laborieux.

Pour prevenir et obvier à cette attache laterale du placenta, je trouverois bon que les femmes après la cohabitation avec leurs hommes restassent couchées sur le dos, même les hanches un peu plus élevées que le dos, etant debout d'éviter toute attitude mauvaise et incommode, afin qu'en maintenant ainsi, pendant le tems que l'oeuf est censé etre encore flottant, les parties dans leur position naturelle et dans l'équilibre, elles contribueroient par là à l'attache naturelle du placenta, à la situation droite de leur fruit et à leur heureuse delivrance, laquelle les recompenseroit d'une gêne d'environ un mois, au bout de quel tems le placenta est taxé avoir pris fortes racines. Je suis persuadé que par cette précaution on previeudroit l'échappement d'une fécondation recente, beaucoup d'avortemens et qu'on conserveroit maint sujet à l'état.

Mais comme la plupart des femmes ne sont pas surs de leur grossesse surtout dans le commencement si par la suite elles s'apperussent par la difformité de leur ventre que le placenta a pris racine lateralement



elles devroient, étant au lit, se coucher, autant qu'il est possible sur le côté opposé et remédier par là en quelque façon à cette obliquité de la matrice et de déterminer son orifice à se présenter en droite ligne, c'est à dire, directement vers la sortie du bassin. J'ai observé dans ma pratique que malgré cette attache laterale du placenta et la deviation subsequente de la matrice les femmes accouchent quelques fois sans beaucoup de peine, mais il est bien rare que le placenta se separe spontanément j'ignore le mécanisme et les heureuses circonstances qui favorisent de tels accouchemens.

J'établis sur l'expérience faite dans tous ces accouchemens les aphorismes suivans.

I. Le côté le plus dur et le plus élevé du ventre d'une femme grosse est toujours l'endroit où est implanté le placenta, ce qui est la cause immediate de la position oblique de la matrice et de l'enfant y contenu. Ceci a même lieu dans les enfans jumeaux. Celui qui a son placenta attaché au fond de la matrice se présentera le premier au passage en ligne droite et celui dont le placenta est plus ou moins éloigné du fond, se présentera plus ou moins obliquement.

II. L'endroit de la matrice où se trouve implanté le Placenta est toujours le centre des contractions uterines, donc, si son attache est lateralement, les contractions sont laterales à l'enfant et ainsi inefficaces.

III. Si l'implantation du placenta s'étend jusqu'au bord de l'orifice de la matrice, l'endroit opposé déchirera plutôt que l'autre ne cède, tant l'attache du placenta le tient serré.

IV. La portion couverte par le placenta est si considerable, que dans plusieurs accouchemens après avoir degagé ce dernier, j'ai tiré cette portion de la matrice hors de la vulve en la prenant même pour un polipe ou autre corps étrangers.

V. Si dans une matrice un placenta s'attache une fois lateralement, elle est sujette à y recidiver, quoique cela ne se fasse pas toujours du même côté. Cette disposition de la matrice dans une premiere grossesse est d'une très mauvaise augure pour les grossesses suivantes.

VI. Si les eaux sont écoulées et que l'enfant ne vient pas dans les vingt quatre heures, tel accouchement est toujours perilleux à cause de la disposition inflammatoire de la matrice.

VII. L'usage du forceps paroît être dangereux tant que l'orifice de la matrice n'est pas entièrement effacé, et que l'enfant n'est pas entre avec la tête dans le petit bassin, ou qu'elle n'est du moins déjà engagée dans le détroit supérieur.

VIII. L'endroit où s'est attaché le placenta est toujours le plus épais de la matrice, le reste est à proportion plus aminci que s'il étoit attaché au fond, parce que cette attache laterale tient serré au moins un tiers de la matrice, les deux autres tiers sont par conséquent obligés de s'étendre au delà du naturel.

IX. Il est rare qu'un placenta greffé aux côtés de la matrice se degage spontanément, parcequ'il n'y a pas de muscle dont les contractions des fibres se reunissent au centre, comme il y en a un au fond de la matrice. En voulant tirer un tel placenta de la maniere



ordinaire on casse le cordon. Le manuel décrit par M. Levret pour tirer le placenta latéral et fait en raquette m'a souvent réussi.

X. Les bains d'eau douce, de vapeur et les fomentations ne conviennent que lorsque l'accouchement est retardé et qu'il est laborieux par la rigidité de l'orifice de la matrice, qui ne veut et ne peut se dilater, et ces moyens sont seulement indiqués tant que les membranes ne sont pas rompues et les eaux écoulées. En tout autre cas ils excitent l'orgasme dans le sang, augment l'afflux des humeurs et l'engorgement dans les parties. Toutefois j'ai remarqué qu'une compresse trempée dans une decoction emolliente ou simplement dans l'eau chaude appliquée sur la partie dans le moment que l'enfant étoit prêt à entrer au couronnement a beaucoup accéléré l'accouchement, surtout lorsque ce fut un premier. J'ai employé le même moyen dans les intervalles que je mettois dans la manoeuvre aux accouchemens laborieux, tant pour laisser reposer la femme et lui donner de la nourriture, que pour me reposer moi même. Il produit toujours de bons effets, quand ce ne seroit que pour empêcher l'accès de l'air extérieur et de rarefier celui qui est entré dans la matrice pendant la manoeuvre.

XI. Lorsqu'une femme en approchant du terme sent des douleurs dans le bas ventre, que l'orifice de la matrice se dilate, et que cette dilatation est accompagnée d'un écoulement de sang, il n'est plus possible de retarder l'accouchement, une saignée faite au bras empêche une hemorrhagie plus considérable et accélère l'accouchement.

X. Dans cette contrée beaucoup de femmes accouchent sans éprouver des douleurs provenant des reins, dans la plupart elles roulent à travers le bas ventre. Dans le grand nombre des femmes qui accouchent il peut s'en trouver de même dans tous les pays, à quoi les accoucheurs et sages-femmes doivent faire attention.

Pour ne pas excéder les bornes d'un mémoire, je finis en desirant que mes soins et mon zèle puissent plaire à une savante et respectable académie. Heureux si je puis toujours mériter son estime et contribuer au progrès de la chirurgie.

à Huningue le 26 Juin 1772. Pietsch

à Mr.
Louis

Monsieur

Je vous prie de présenter ce second mémoire sur les accouchement laborieux à l'Académie Royale de Chirurgie et de me communiquer dans son tems le rapport des commissaires sur tous les deux. Vous m'avez témoigné par votre dernière qu'elle voyoit avec plaisir que je suis à portée de la célèbre université de Bâle et qu'elle seroit bien aise si je voulois lui communiquer les questions chirurgicales qui seroient discutées en cette faculté. J'en ai parlé au Recteur magnifique qui m'a promis qu'il me les communiquerait à mesure qu'il y en auroit et même celles des années passées, que je lui ai demandé. Si l'académie jugeroit à propos de couronner mon zèle par le prix d'émulation, cette marque d'estime me donneroit un relief auprès de cette université, et faciliteroit le succès de ma négociation et m'encourageroit à continuer mon travail pour le progrès de l'art. Je vous serai fort obligé si vous bien contribuer à m'octroyer cet honneur. J'ai l'honneur avec considération et la plus parfaite estime

Monsieur Pietsch



1. The first part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

2. The second part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

3. The third part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

4. The fourth part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

5. The fifth part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

6. The sixth part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

7. The seventh part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

8. The eighth part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

9. The ninth part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.

10. The tenth part of the paper is a list of names, which are arranged in two columns. The names are written in a cursive hand, and some are underlined. The list appears to be a roster of people, possibly members of a club or organization.